

# 中華日報

(第一版) 今日本報附張 (內附郵政特准掛號)

零售每份五分

THE CENTRAL CHINA DAILY NEWS

之皮膚病 塗 靈

乾濕癬癩 疥瘡癩病 一切皮膚病 均有特效

此藥膏係由名醫精製，專治一切皮膚病，如乾濕癬癩、疥瘡癩病等，均有特效。凡患此症者，請速購用，以免延誤。



上海四馬路 西大藥房發行

## 東方雜誌

刊月半

卷二十三第 號四十三第

(第二十六) 報畫方東

世界經濟的未來與管理通貨  
華北問題  
非自治與美國遠東政策  
遠東的經濟與政治  
世界經濟的未來與管理通貨  
中國新幣制政策與國際經濟之關係  
現階段中國經濟建設與國際經濟之關係  
日趨嚴重的農村經濟問題  
地中海上的軍事形勢  
世界殖民地分割的回顧與前瞻

華盛頓會議後之國際形勢  
華北問題  
非自治與美國遠東政策  
遠東的經濟與政治  
世界經濟的未來與管理通貨  
中國新幣制政策與國際經濟之關係  
現階段中國經濟建設與國際經濟之關係  
日趨嚴重的農村經濟問題  
地中海上的軍事形勢  
世界殖民地分割的回顧與前瞻

定價：本埠每月一元二角，外埠每月一元五角

發行所：商務印書館



### 克寧乳粉

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

克寧乳粉之優點  
克寧乳粉之用途

## 本報代收各省水災賑款啟事

本年入夏以來，連綿大雨，山洪暴發，災區遍及十餘省，災民達數千萬，慘不忍睹。本報同人，聞風之下，莫不痛心疾首。爰發起代收各省水災賑款，以資救濟。凡我同胞，如有義舉，請將賑款寄交本報，以便彙轉賑委會。此啟。

十二月十五日收到勞鶴巢先生捐款國幣五元正，除即擊掌收據外，特再登報鳴謝。

### 國債基金管理委員會二十四年十一月份基金收支報告

一、基金總額：國幣一千二百萬元  
二、收入：國幣一百二十萬元  
三、支出：國幣一百二十萬元  
四、結存：國幣一百二十萬元

### 兩犯上訴改處罰金

王德興與李元各罰一百元

### 韓月清屍體已發現

被綁匪勒死屍體已發現

### 盧老七賭博殺人案

在偵查時指證確鑿

### 調停解除契約

先退一萬餘元

### 斧砍愛妻

因口角致傷

### 僱主竟匿沒收

僱員工資

### 家庭兩訟案同判決

鄭氏控退還房產案

### 婦女出走後追尋

調停解除契約

### 淪為竊賊

因生活所迫



6

1

1

1

















中國國民黨  
一三三四五屆  
中央執監委員調查  
歷任中央執監委調查表（以各國先後爲次序）  
第一屆 第二屆 第三屆 第四屆 第五屆 附

執委

執委 執委 執委 執委 執委 執委 執委 執委 執委 執委

執委 執委 執委 執委 執委 執委 執委 執委

命倫  
 與美  
 忠信  
 華靡  
 一冲  
 而茲  
 斯才備

鳳山  
 鳳山寶  
 覺仲昌  
 普濟  
 泉鑑  
 向

式輝  
鐵骨  
網寬  
傲

執  
委

[illegible][illegible]

**黃益壽** 醫專割包皮

**事實證明**

**包皮長之害**

（一）本館研究此症十餘年，（二）割下包皮之成績，  
清大一大瓶，（三）用此法治療，故無痛苦，（四）結胎發生，  
五）本長全無痛苦，（四）割下時，可隨時作，（五）不用住院，  
（六）割下後，全無痛苦，（七）可隨時作，（八）不用住院，  
（九）本館研究此症十餘年，（十）割下包皮之成績，  
（十一）清大一大瓶，（十二）用此法治療，故無痛苦，  
（十三）結胎發生，（十四）五）本長全無痛苦，  
（十五）（四）割下時，可隨時作，（十六）（五）不用住院，  
（十七）（六）割下後，全無痛苦，（十八）（七）可隨時作，  
（十九）（八）不用住院，（二十）（九）本館研究此症十餘年，  
（二十一）（十）割下包皮之成績，（二十二）（十一）清大一大瓶，  
（二十三）（十二）用此法治療，故無痛苦，（二十四）（十三）結胎發生，  
（二十五）（十四）五）本長全無痛苦，（二十六）（四）割下時，  
（二十七）（五）不用住院，（二十八）（六）割下後，全無痛苦，  
（二十九）（七）可隨時作，（三十）（八）不用住院，  
（三十一）（九）本館研究此症十餘年，（三十二）（十）割下包皮之成績，  
（三十三）（十一）清大一大瓶，（三十四）（十二）用此法治療，  
（三十五）（十三）結胎發生，（三十六）（十四）五）本長全無痛苦，  
（三十七）（四）割下時，可隨時作，（三十八）（五）不用住院，  
（三十九）（六）割下後，全無痛苦，（四十）（七）可隨時作，  
（四十一）（八）不用住院，（四十二）（九）本館研究此症十餘年，  
（四十三）（十）割下包皮之成績，（四十四）（十一）清大一大瓶，  
（四十五）（十二）用此法治療，故無痛苦，（四十六）（十三）結胎發生，  
（四十七）（十四）五）本長全無痛苦，（四十八）（四）割下時，  
（四十九）（五）不用住院，（五十）（六）割下後，全無痛苦，  
（五十一）（七）可隨時作，（五十二）（八）不用住院，  
（五十三）（九）本館研究此症十餘年，（五十四）（十）割下包皮之成績，  
（五十五）（十一）清大一大瓶，（五十六）（十二）用此法治療，  
（五十七）（十三）結胎發生，（五十八）（十四）五）本長全無痛苦，  
（五十九）（四）割下時，可隨時作，（六十）（五）不用住院，  
（六十一）（六）割下後，全無痛苦，（六十二）（七）可隨時作，  
（六十三）（八）不用住院，（六十四）（九）本館研究此症十餘年，  
（六十五）（十）割下包皮之成績，（六十六）（十一）清大一大瓶，  
（六十七）（十二）用此法治療，故無痛苦，（六十八）（十三）結胎發生，  
（六十九）（十四）五）本長全無痛苦，（七十）（四）割下時，  
（七十一）（五）不用住院，（七十二）（六）割下後，全無痛苦，  
（七十三）（七）可隨時作，（七十四）（八）不用住院，  
（七十五）（九）本館研究此症十餘年，（七十六）（十）割下包皮之成績，  
（七十七）（十一）清大一大瓶，（七十八）（十二）用此法治療，  
（七十九）（十三）結胎發生，（八十）（十四）五）本長全無痛苦，  
（八十一）（四）割下時，可隨時作，（八十二）（五）不用住院，  
（八十三）（六）割下後，全無痛苦，（八十四）（七）可隨時作，  
（八十五）（八）不用住院，（八十六）（九）本館研究此症十餘年，  
（八十七）（十）割下包皮之成績，（八十八）（十一）清大一大瓶，  
（八十九）（十二）用此法治療，故無痛苦，（九十）（十三）結胎發生，  
（九十一）（十四）五）本長全無痛苦，（九十二）（四）割下時，  
（九十三）（五）不用住院，（九十四）（六）割下後，全無痛苦，  
（九十五）（七）可隨時作，（九十六）（八）不用住院，  
（九十七）（九）本館研究此症十餘年，（九十八）（十）割下包皮之成績，  
（九十九）（十一）清大一大瓶，（一百）（十二）用此法治療，  
（一百零一）（十三）結胎發生，（一百零二）（十四）五）本長全無痛苦，  
（一百零三）（四）割下時，可隨時作，（一百零四）（五）不用住院，  
（一百零五）（六）割下後，全無痛苦，（一百零六）（七）可隨時作，  
（一百零七）（八）不用住院，（一百零八）（九）本館研究此症十餘年，  
（一百零九）（十）割下包皮之成績，（一百一十）（十一）清大一大瓶，  
（一百一十一）（十二）用此法治療，故無痛苦，（一百一十二）（十三）結胎發生，  
（一百一十三）（十四）五）本長全無痛苦，（一百一十四）（四）割下時，  
（一百一十五）（五）不用住院，（一百一十六）（六）割下後，全無痛苦，  
（一百一十七）（七）可隨時作，（一百一十八）（八）不用住院，  
（一百一十九）（九）本館研究此症十餘年，（一百二十）（十）割下包皮之成績，  
（一百二十一）（十一）清大一大瓶，（一百二十二）（十二）用此法治療，  
（一百二十三）（十三）結胎發生，（一百二十四）（十四）五）本長全無痛苦，  
（一百二十五）（四）割下時，可隨時作，（一百二十六）（五）不用住院，  
（一百二十七）（六）割下後，全無痛苦，（一百二十八）（七）可隨時作，  
（一百二十九）（八）不用住院，（一百三十）（九）本館研究此症十餘年，  
（一百三十一）（十）割下包皮之成績，（一百三十二）（十一）清大一大瓶，  
（一百三十三）（十二）用此法治療，故無痛苦，（一百三十四）（十三）結胎發生，  
（一百三十五）（十四）五）本長全無痛苦，（一百三十六）（四）割下時，  
（一百三十七）（五）不用住院，（一百三十八）（六）割下後，全無痛苦，  
（一百三十九）（七）可隨時作，（一百四十）（八）不用住院，  
（一百四十一）（九）本館研究此症十餘年，（一百四十二）（十）割下包皮之成績，  
（一百四十三）（十一）清大一大瓶，（一百四十四）（十二）用此法治療，  
（一百四十五）（十三）結胎發生，（一百四十六）（十四）五）本長全無痛苦，  
（一百四十七）（四）割下時，可隨時作，（一百四十八）（五）不用住院，  
（一百四十九）（六）割下後，全無痛苦，（一百五十）（七）可隨時作，  
（一百五十一）（八）不用住院，（一百五十二）（九）本館研究此症十餘年，  
（一百五十三）（十）割下包皮之成績，（一百五十四）（十一）清大一大瓶，  
（一百五十五）（十二）用此法治療，故無痛苦，（一百五十六）（十三）結胎發生，  
（一百五十七）（十四）五）本長全無痛苦，（一百五十八）（四）割下時，  
（一百五十九）（五）不用住院，（一百六十）（六）割下後，全無痛苦，  
（一百六十一）（七）可隨時作，（一百六十二）（八）不用住院，  
（一百六十三）（九）本館研究此症十餘年，（一百六十四）（十）割下包皮之成績，  
（一百六十五）（十一）清大一大瓶，（一百六十六）（十二）用此法治療，  
（一百六十七）（十三）結胎發生，（一百六十八）（十四）五）本長全無痛苦，  
（一百六十九）（四）割下時，可隨時作，（一百七十）（五）不用住院，  
（一百七十一）（六）割下後，全無痛苦，（一百七十二）（七）可隨時作，  
（一百七十三）（八）不用住院，（一百七十四）（九）本館研究此症十餘年，  
（一百七十五）（十）割下包皮之成績，（一百七十六）（十一）清大一大瓶，  
（一百七十七）（十二）用此法治療，故無痛苦，（一百七十八）（十三）結胎發生，  
（一百七十九）（十四）五）本長全無痛苦，（一百八十）（四）割下時，  
（一百八十一）（五）不用住院，（一百八十二）（六）割下後，全無痛苦，  
（一百八十三）（七）可隨時作，（一百八十四）（八）不用住院，  
（一百八十五）（九）本館研究此症十餘年，（一百八十六）（十）割下包皮之成績，  
（一百八十七）（十一）清大一大瓶，（一百八十八）（十二）用此法治療，  
（一百八十九）（十三）結胎發生，（一百九十）（十四）五）本長全無痛苦，  
（一百九十一）（四）割下時，可隨時作，（一百九十二）（五）不用住院，  
（一百九十三）（六）割下後，全無痛苦，（一百九十四）（七）可隨時作，  
（一百九十五）（八）不用住院，（一百九十六）（九）本館研究此症十餘年，  
（一百九十七）（十）割下包皮之成績，（一百九十八）（十一）清大一大瓶，  
（一百九十九）（十二）用此法治療，故無痛苦，（二百）（十三）結胎發生，  
（二百零一）（十四）五）本長全無痛苦，（二百零二）（四）割下時，  
（二百零三）（五）不用住院，（二百零四）（六）割下後，全無痛苦，  
（二百零五）（七）可隨時作，（二百零六）（八）不用住院，  
（二百零七）（九）本館研究此症十餘年，（二百零八）（十）割下包皮之成績，  
（二百零九）（十一）清大一大瓶，（二百一十）（十二）用此法治療，  
（二百一十一）（十三）結胎發生，（二百一十二）（十四）五）本長全無痛苦，  
（二百一十三）（四）割下時，可隨時作，（二百一十四）（五）不用住院，  
（二百一十五）（六）割下後，全無痛苦，（二百一十六）（七）可隨時作，  
（二百一十七）（八）不用住院，（二百一十八）（九）本館研究此症十餘年，  
（二百一十九）（十）割下包皮之成績，（二百二十）（十一）清大一大瓶，  
（二百二十一）（十二）用此法治療，故無痛苦，（二百二十二）（十三）結胎發生，  
（二百二十三）（十四）五）本長全無痛苦，（二百二十四）（四）割下時，  
（二百二十五）（五）不用住院，（二百二十六）（六）割下後，全無痛苦，  
（二百二十七）（七）可隨時作，（二百二十八）（八）不用住院，  
（二百二十九）（九）本館研究此症十餘年，（二百三十）（十）割下包皮之成績，  
（二百三十一）（十一）清大一大瓶，（二百三十二）（十二）用此法治療，  
（二百三十三）（十三）結胎發生，（二百三十四）（十四）五）本長全無痛苦，  
（二百三十五）（四）割下時，可隨時作，（二百三十六）（五）不用住院，  
（二百三十七）（六）割下後，全無痛苦，（二百三十八）（七）可隨時作，  
（二百三十九）（八）不用住院，（二百四十）（九）本館研究此症十餘年，  
（二百四十一）（十）割下包皮之成績，（二百四十二）（十一）清大一大瓶，  
（二百四十三）（十二）用此法治療，故無痛苦，（二百四十四）（十三）結胎發生，  
（二百四十五）（十四）五）本長全無痛苦，（二百四十六）（四）割下時，  
（二百四十七）（五）不用住院，（二百四十八）（六）割下後，全無痛苦，  
（二百四十九）（七）可隨時作，（二百五十）（八）不用住院，  
（二百五十一）（九）本館研究此症十餘年，（二百五十二）（十）割下包皮之成績，  
（二百五十三）（十一）清大一大瓶，（二百五十四）（十二）用此法治療，  
（二百五十五）（十三）結胎發生，（二百五十六）（十四）五）本長全無痛苦，  
（二百五十七）（四）割下時，可隨時作，（二百五十八）（五）不用住院，  
（二百五十九）（六）割下後，全無痛苦，（二百六十）（七）可隨時作，  
（二百六十一）（八）不用住院，（二百六十二）（九）本館研究此症十餘年，  
（二百六十三）（十）割下包皮之成績，（二百六十四）（十一）清大一大瓶，  
（二百六十五）（十二）用此法治療，故無痛苦，（二百六十六）（十三）結胎發生，  
（二百六十七）（十四）五）本長全無痛苦，（二百六十八）（四）割下時，  
（二百六十九）（五）不用住院，（二百七十）（六）割下後，全無痛苦，  
（二百七十一）（七）可隨時作，（二百七十二）（八）不用住院，  
（二百七十三）（九）本館研究此症十餘年，（二百七十四）（十）割下包皮之成績，  
（二百七十五）（十一）清大一大瓶，（二百七十六）（十二）用此法治療，  
（二百七十七）（十三）結胎發生，（二百七十八）（十四）五）本長全無痛苦，  
（二百七十九）（四）割

民國政府  
國民政府  
冊  
冊

白濁丸

非佐賴

每瓶二角半  
各大藥房均有出售  
總發行所 上海

新開九金六  
星期日照常  
郵局寄全無生性時西門外寶樹堂藥舖左面二號

內閣府  
註冊  
**白濁丸**  
姚佐頓大藥房  
電話九二六七五

7

10







[illegible]